

- Park HL, Kim LS. The Current Role of Vacuum Assisted Breast Biopsy System in Breast Disease. J Breast Cancer. 2011 Mar;14(1):1-7.
- London Cancer Surgical Guidelines June 2015.
- Pinder SE, Shaaban A, Deb R, Desai A, Gandhi G, Lee AHS, et al. NHS Breast Screening multidisciplinary working group guidelines for the diagnosis and management of breast lesions of uncertain malignant potential on core biopsy (B3 lesions). Clin Radiol. 2018 Aug;73(8): 682-692.
- Whitworth P, Hogan A, Ferko N, Son D, Wang F, Xiong Y, et al. Reduced Hospital Costs for Ultrasound-guided Vacuum-assisted Excision Compared with Open Surgery in Patients with Benign Breast Masses and High-risk Lesions. Journal of Breast Imaging. 2020; Vol. 2, Issue 5:452-61.
- Rageth CJ, O'Flynn EAM, Comstock C, Kurtz C, Kubik R, Madjar H, et al. First International Consensus Conference on lesions of uncertain malignant potential in the breast (B3 lesions). Breast Cancer Res Treat. 2016 Sep;159(2):203-13.
- Rageth CJ, O'Flynn EAM, Pinker K, Kubik-Huch RA, Munding A, Decker T, et al. Second International Consensus Conference on lesions of uncertain malignant potential in the breast (B3 lesions). Breast Cancer Res Treat. 2019 Apr;174(2):279-296.

Вакуумная биопсия, альтернатива хирургической операции на молочной железе

www.vab-guide.bd.com



Вакуумная биопсия, альтернатива хирургической операции на молочной железе



BD Switzerland Sarl
Terre Bonne Park – A4
Route De Crassier, 17
1262 Eysins, Vaud. Switzerland
T: +41 21 556 30 00

BD-49157





Вакуумная биопсия, альтернатива хирургической операции на молочной железе

Вакуумная биопсия (ВБ) – это метод биопсии молочной железы, который позволяет избежать хирургического вмешательства при необходимости подтверждения диагноза и при лечении многочисленных доброкачественных образований у женщин.

Биопсия молочной железы без госпитализации

ВБ не требует госпитализации и размещения в операционном зале. Эта процедура проводится в амбулаторных условиях под местной анестезией, хорошо переносится пациентами любого возраста и с заболеваниями, при которых хирургическое вмешательство под общим наркозом может представлять опасность.

Меньше шрамов, быстрее восстановление

ВБ осуществляется с помощью иглы, которая вводится в молочную железу и через которую «затягивается» множество фрагментов пораженного участка. Нет необходимости разрезать кожу и накладывать швы, поэтому шрамов не остается. Время восстановления

после ВБ гораздо меньше, чем после хирургических операций, поэтому можно вернуться к нормальной жизни уже через несколько дней.

При каких условиях назначается ВБ?

ВБ можно считать альтернативой хирургической биопсии в трех случаях:

- > При необходимости точного подтверждения диагноза определенных поражений, выявленных при маммографии, УЗИ или МРТ.
- > При невозможности провести диагностику с помощью других методов биопсии (цитологической пункции или трепанобиопсии).
- > При лечении часто встречающихся доброкачественных образований у женщин, таких как фиброаденомы и папилломы (доброкачественные опухоли, которые являются причиной выделения жидкости из соска).

Совместная оценка гинеколога или хирурга и радиолога-маммолога является определяющим фактором при решении о проведении вакуумной биопсии вместо хирургической.

